

Feen-a-mint®

Picosulfato de sodio

Chicle Laxante

Sabor Menta - 18 chicles

Venta Libre – Industria Argentina.

Indicaciones: tratamiento sintomático de la constipación. **Dosis:** adultos y niños mayores de 12 años: 1 a 2 chicles. Niños menores de 12 años: consultar a su médico. **Administración:** mascar a la hora de acostarse.

Fórmula: Cada chicle contiene: Picosulfato de sodio 5 mg. Excipientes: gelatina AAA; azúcar refinada; almidón de maíz; esencia de menta; cera carnauba; núcleo de goma sabor menta. **Acción terapéutica:** laxante estimulante. Modifica el intercambio hidroelectrolítico intestinal y estimula la motricidad colónica. **Precauciones y advertencias:** no es una golosina. El tratamiento medicamentoso de la constipación no es más que un adyuvante del tratamiento higiénico dietético. **Feen-a-Mint®** no debe administrarse en forma prolongada ni a dosis mayores que las recomendadas en pacientes bajo tratamiento diurético, digitalico, o esteroideo. La utilización prolongada de laxantes se desaconseja: no exceder de 8 a 10 días de tratamiento. El uso excesivo de laxantes puede provocar situación de "dependencia" que requiere de ingesta regular de laxantes, aumentando la posología necesaria en caso de constipación severa; o la "enfermedad de los laxantes" con colopatía funcional severa, melanosis rectocolónica y alteraciones hidroelectrolíticas con hipokalemia. **Embarazo y lactancia:** no se aconseja su uso durante este período. Cuando tenga dolores de vientre, de estómago, náuseas o vómitos, no tome laxantes sin consultar antes a su médico. **Contraindicaciones:** antecedentes de hipersensibilidad al principio activo o a cualquiera de los integrantes de la fórmula. Colopatías orgánicas complementarias (enfermedad de Crohn, rectocolitis ulcerosa), síndrome oclusivo o subocclusivo, síndromes dolorosos abdominales sin diagnóstico. Pacientes con cuadros abdominales agudos (por ej: obstrucción intestinal). **Interacciones:** antiarrítmicos (tipo quinina), sotalol, amiodarona, vinkamina, digitálicos. Drogas hipokalemiantes (anfotericina B, corticoides y diuréticos hipokalemiantes, solos o asociados). **Efectos adversos:** puede observarse malestar abdominal de tipo cólico. El uso prolongado o una sobredosis puede provocar diarrea con pérdida excesiva de agua y electrolitos particularmente potasio; desarrollo de un colon atónico no funcionante. Puede provocar dolores abdominales o diarrea, especialmente en personas con colon irritable. Su administración prolongada y en dosis elevadas puede producir pérdidas de potasio o hipokalemia. **Sobredosis:** en caso de sobredosis accidental se recomienda consultar con un Centro Toxicológico. Hosp. de Niños Ricardo Gutierrez: Tel. (011) 4962-6666 - Hosp. Posadas: Tel. (011) 4658-7777. Centro Nac. de Intoxicaciones: Tel. 0800-3330160. **Presentaciones:** envases conteniendo 6 y 18 chicles.

Esp. Med. aut. por el M.S. - Certificado N° 6.066

Elaborado en Calle 3 s/Nro. esquina 103, Pque. Industrial Norte,
San Luis, Pcia. de San Luis.

Laboratorio Elea S.A.C.I.F. y A., Sanabria 2353, CABA.

Director Técnico: Fernando Toneguzzo. Farmacéutico.

