

AGAROL[®]

Picosulfato de sodio

Chicle Laxante

Sabor Frutal - 12 chicles

Venta Libre - Industria Argentina.

Indicaciones: *tratamiento sintomático de la constipación.* **Dosis:** *Adultos y niños mayores de 12 años: 1 a 2 chicles. Niños menores de 12 años: consultar a su médico.* **Administración:** *mascar a la hora de acostarse. No es una golosina.* **Fórmula:** *Cada chicle contiene:* picosulfato de sodio 5 mg. Excipientes: azúcar; almidón de maíz; gelatina; cera carnauba; núcleo de goma; sabor tutti-fruti; c.s. **Precauciones y advertencias:** El tratamiento medicamentoso de la constipación no es más que un adyuvante del tratamiento higiénico dietético. Agarol chicle laxante no debe administrarse en forma prolongada ni a dosis mayores que las recomendadas en pacientes bajo tratamiento diurético, digitálico o esteroideo. La utilización prolongada de laxantes se desaconseja: no exceder de 8 a 10 días de tratamiento. El uso excesivo de laxantes puede provocar situación de "dependencia" que requiere de ingesta regular de laxantes, aumentando la posología necesaria en caso de constipación severa; o la "enfermedad de los laxantes" con colopatía funcional severa, melanosis recto colónica y alteraciones hidroelectrolíticas con hipokalemia. **Embarazo y lactancia:** *no se aconseja su uso durante este período. Cuando tenga dolores de vientre, de estómago, náuseas o vómitos, no tome laxantes sin consultar antes a su médico.*

Acción terapéutica: laxante estimulante. Modifica el intercambio hidroelectrolítico intestinal y estimula la motricidad colónica. **Contraindicaciones:** antecedentes de hipersensibilidad al principio activo o a cualquiera de los integrantes de la fórmula. Colopatías orgánicas complementarias (enfermedad de Crohn, rectocolitis ulcerosa), síndrome oclusivo o subocclusivo, síndromes dolorosos o abdominales sin diagnóstico. Pacientes con cuadros abdominales agudos (por ej: obstrucción intestinal). **Interacciones:** Antiarrítmicos (tipo quinidina), sotalol, amiodarona, vinkamina, digitálicos. Drogas hipokalemiantes (anfotericina B, corticoides y diuréticos hipokalemiantes, solos y asociados). **Efectos adversos:** puede observarse malestar abdominal de tipo cólico. El uso prolongado o una sobredosis puede provocar diarrea con pérdida excesiva de agua y electrolitos, particularmente potasio; desarrollo de un colon atónico no funcionando. Puede provocar dolores abdominales o diarrea, especialmente en personas con colon irritable. Su administración prolongada y en dosis elevadas puede producir pérdidas de potasio o hipokalemia. **Sobredosis:** en caso de sobredosis accidental concurrir al hospital más cercano o comunicarse con un Ctro. de Intoxicaciones: (011)4962-6666/2247 ó (011)4658-7777 ó 0800-3330160.

Conservar en sitio fresco a menos de 30 °C. Ante cualquier duda consulte a su médico y/o farmacéutico. Mantener éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Esp. Med. aut. por el Ministerio de Salud - Certificado N° 37.212 -Elaborado en

Calle 3 s/Nro. esquina 103, Pque. Industrial Norte, San Luis, Pcia. de San.Luis

Laboratorio Elea S.A.C.I.F. y A., Sanabria 2353, CABA.

Director Técnico: Fernando Toneguzzo. Farmacéutico.

