

AGAROL® GELCAPS

Picosulfato de Sodio

Cápsulas blandas
Industria Argentina - Venta Libre

Fórmula:

Cada cápsula blanda contiene: Picosulfato de sodio 5 mg. Excipientes: polietilenglicol 400; povidona; agua purificada; propilenglicol; gelatina; glicerina; metilparabeno; propilparabeno; rojo punzó; azul brillante.

Indicaciones:

Tratamiento sintomático de la constipación.

Acción terapéutica:

Laxante estimulante. Modifica el intercambio hidroelectrolítico intestinal y estimula la motricidad colónica.

Dosis y administración:

Adultos y niños mayores de 12 años: una cápsula antes de acostarse.

Precauciones y advertencias:

El tratamiento medicamentoso de la constipación no es más que un adyuvante del tratamiento higiénico dietético.

AGAROL® no debe administrarse en forma prolongada ni a dosis mayores que las recomendadas en pacientes bajo tratamiento diurético, digitalico o esteroideo.

La utilización prolongada de laxantes se desaconseja: no exceder de 8 a 10 días de tratamiento. El uso excesivo de laxantes puede provocar: situación de "dependencia" que requiere de ingesta regular de laxantes, aumentando la posología necesaria en caso de constipación severa; ó "la enfermedad de los laxantes" con colopatía funcional severa, melanosis recto colónica y alteraciones hidroelectrolíticas con hipokalemia.

Embarazo y lactancia: No se aconseja su uso durante este período.

Cuando tenga dolores de vientre, de estómago, náuseas o vómitos, no tome laxantes sin consultar antes a su médico.

Contraindicaciones:

Niños menores de 12 años. Colopatías orgánicas complementarias (enfermedad de Crohn, rectocolitis ulcerosa), síndrome oclusivo o suboclusivo, síndromes dolorosos o abdominales sin diagnóstico. Pacientes con cuadros abdominales agudos (por ejemplo obstrucción intestinal). Hipersensibilidad a los componentes.

Interacciones:

Antiarrítmicos (tipo quinina, sotalol, amiodarona, vincamina, digitalicos).

Drogas hipokalemiantes (anfotericina B, corticoides y diuréticos hipokalemiantes solos y asociados).

Efectos adversos:

Puede observarse malestar abdominal de tipo cólico. El uso prolongado o una sobredosis puede provocar diarrea con pérdida excesiva de agua y electrolitos, particularmente potasio; desarrollo de un colon atónico no funcionante.

Puede provocar dolores abdominales o diarrea, especialmente en personas con colon irritable. Su administración prolongada y en dosis elevadas puede producir pérdidas de potasio e hipokalemia.

Sobredosis:

En caso de sobredosis accidental pueden presentarse dolores abdominales o diarrea, deshidratación con pérdida de electrolitos, especialmente potasio con riesgo de hipokalemia.

En caso de sobredosis accidental concurrir al hospital más cercano o contactarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez

Tel: (011) 4962-6666 / 4962-2247

Hospital A. Posadas

Tel: (011) 4654-6648 / 4658-7777

Centro Nacional de Intoxicaciones

Tel: 0800-333-0160

Mantener éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. Ante cualquier duda consulte a su médico y/o farmacéutico.

Conservar entre 15 y 25 °C. Proteger de la luz y de la humedad.

Presentación:

Envases conteniendo 12 y 24 cápsulas blandas. Esp. Med. aut. por el Ministerio de Salud. Cert. Nº 37.212 - LABORATORIO ELEA S.A.C.I.F. y A., bajo licencia exclusiva de Warner Lambert Co. USA. Elaborado en Av. Márquez 691, Loma Hermosa. Pcia. de Buenos Aires. Dir. Téc.: Fernando G. Toneguzzo, Farmacéutico. Última revisión: Marzo/2003 502455-00 1-cs-g