



Rapilax®

Picosulfato de sodio

SOLUCIÓN
GOTAS

Venta libre
Industria
Argentina

ELEA

Composición: Cada 100 ml contiene: Picosulfato de sodio 750 mg. Excipientes: Metilparabeno, Propilparabeno, Sorbitol 70%, Agua purificada c.s.

Acción Terapéutica: Laxante.

Indicaciones: Tratamiento sintomático de la constipación.

Posología y forma de administración: Rapilax puede ingerirse preferentemente por las noches con poco líquido (agua, gaseosas, leche, etc.) pues carece de sabor y color.

La dosis recomendada es la siguiente: **Adultos:** 5 a 10 gotas. **Niños de 12 a 15 años:** 3 a 6 gotas.

En casos necesarios y sin que se presenten efectos colaterales, se puede aumentar la dosis a razón de 1 gota por día, hasta lograr la dosis individual.

Dosis máxima: **Adultos:** 26 gotas por día (equivalentes a 10 mg). **Niños entre 12 y 15 años de edad:** 13 gotas por día (equivalentes a 5 mg).

Precauciones y advertencias: Si sufre alguna enfermedad intestinal, constipación persistente o si tiene dolores abdominales no debe tomar laxantes o purgantes sin consultar previamente al médico. No utilizar por más de 8 a 10 días.

En casos raros pueden presentarse dolores abdominales.

El uso prolongado puede provocar diarrea con pérdida de agua y sales.

Para el tratamiento de la constipación es importante agregar fibras vegetales en la dieta y aumentar la actividad física.

Si usted está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.

Debe usarse con precaución en pacientes que reciban diuréticos, digitálicos o corticoides.

Usar con precaución en personas mayores y si existe descompensación cardíaca o insuficiencia renal.

Se contraindica en enfermedad abdominal aguda o inflamatoria de colon y en obstrucción intestinal.

Sobredosificación: Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología: Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 2247 - Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777. Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160

Presentación: Frasco gotero de 10 ml.

Conservar a temperatura ambiente (entre 10 a 30 °C), en lugar seco y en su envase original.

ESTE MEDICAMENTO, COMO CUALQUIER OTRO, DEBE MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MEDICO Y/O FARMACEUTICO.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 33.309.

Elab. en Av. Int. Tomkinson 2054, Beccar. Prov. de Bs. As.

Laboratorio Elea S.A.C.I.F. y A. Sanabria 2353 CABA. Dir. Tec. Isaac J. Nisenbaum, Farmacéutico.

Fecha de última revisión: Noviembre / 2000.

502174-00

3-jma-p

Dudas, Consultas? **0 800 333 ELEA**
(3532)