

# Supositorios de Glicerina

## CORTOS ADULTOS

12 supositorios

Venta Libre – Industria Argentina.

**Fórmula:** Cada supositorio de 2,92 g contiene: glicerina 2,68 g. Exc.: ácido esteárico 205 mg; hidróxido de sodio 27,7 mg; cloruro de sodio 1,7 mg. **Acción terapéutica:** Los supositorios de glicerina constituyen un medio para desocupar rápidamente la última parte del intestino. Estos supositorios contienen la mayor cantidad posible de glicerina refinada, libre de sustancias perjudiciales. **Indicaciones:** Constipación ocasional. **Uso del medicamento:** Lea detenidamente esta información. Adultos: Para lograr la evacuación, aplicar un supositorio para adultos y dejar actuar de 15 a 30 minutos. No es necesario que el supositorio se disuelva completamente para que produzca su efecto. En caso de constipación severa, se puede repetir la aplicación 30 a 60 minutos después de la primera aplicación. **Advertencias y Precauciones:** Sólo para ser usado por vía rectal. No utilizar por más de una semana sin consultar al médico. Ante todo cuadro de constipación reciente no justificado por un cambio en el modo de vida, o acompañado de dolor, fiebre, distensión del vientre, náuseas o vómitos, consultar al médico. La aparición de sangre rectal o la falla en obtener movimiento de intestino luego del tratamiento puede indicar una causa seria, por lo que debe interrumpirse el tratamiento y consultar al médico. Evitar su uso en presencia de hemorroides, fisura anal o rectocolitis hemorrágica. Efectos colaterales o secundarios: puede causar ardor en la zona anorrectal. **Sobredosificación:** Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: Tel: (011) 4962-6666/2247 - Hospital A Posadas: Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777. **Presentación:** Envases conteniendo 4, 10 y 12 unidades.

**Conservar por debajo de 30 °C, en el envase perfectamente cerrado.**  
**Mantener éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.**  
**Ante la menor duda consulte a su médico y/o farmacéutico.**

Esp. Med. aut. por el Ministerio de Salud  
Certificado N° 8.810 - Elaborado por  
Laboratorio Elea S.A.C.I.F. y A., bajo lic.  
exclusiva de Warner-Lambert Co., USA.  
Sanabria 2353, CABA.  
Dir. Téc.: Fernando Toneguzzo. Farmacéutico.

Bajo Licencia W.L.



# ELEA